

## | Informatie voor ouders

Beste ouder(s),

Uw kind dient op advies van de kinderarts puffs via de **AeroChamber®** (= voorzetkamer) toegediend te krijgen. Met deze informatiefolder willen we wat meer uitleg geven over het correct gebruik van de AeroChamber®.

Bij kinderen heeft de behandeling van astma door **inhalatietherapie** de voorkeur boven de andere toedieningsvormen. Om medicatie (zoals Ventolin®, Flixotide®, ...) zo goed mogelijk vanuit een dosis-aerosol te inhaleren, wordt geadviseerd een voorzetkamer (bv. AeroChamber®) te gebruiken. Correct gebruik van deze voorzetkamer is uitermate belangrijk.



## | Gebruik van de AeroChamber®

- Schud de dosis-aerosol (of spuitbusje) voor gebruik (om het medicijn met het drijfgas te kunnen mengen)
- Verwijder het beschermkapje van de verstuiver
- Plaats de dosis-aerosol in de AeroChamber®. De puffer met het geneesmiddel is naar boven gericht
- Plaats het kind op uw schoot met het hoofd iets achterover
- Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het gezichtsmasker over de mond en neus van uw kind. Zorg ervoor dat het masker goed aansluit en druk het stevig aan
- Druk eenmaal op de puffer zodat een dosis wordt verstoven. Laat het kind 10 maal in- en uitademen door de AeroChamber®, zonder het masker weg te nemen
- Indien u meerdere puffjes dient te geven, dient u de dosis-aerosol telkens opnieuw te schudden
- Haal de dosis-aerosol uit de AeroChamber® en plaats het beschermkapje op de verstuiver
- Laat het kind na gebruik de mond spoelen of een slokje drinken ter preventie van schimmelinfecties in de mond

## | Onderhoud van de AeroChamber®

Bij dagelijks gebruik van de AeroChamber® is het aangeraden om deze eenmaal per week te reinigen met een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en lauw water.

- Verwijder het masker en de rubberring van de voorzetkamer
- Laat de delen 15 minuten weken
- Spoel de inhalatiekamer met lauw-warm water, zonder zeep
- Laat de AeroChamber® verticaal drogen aan de lucht. Niet droogwrijven (anders wordt deze statisch en slaan de medicijnen neer tegen de wand). Het masker kan u ook gewoon afspoelen
- Zet de AeroChamber® terug in elkaar eenmaal alles helemaal droog is.



© AeroChamber

## | Bijkomende tips

- Indien uw kind zowel een luchtwegverwijder (bv. Ventolin®) als een luchtwegbeschermer (bv. Flixotide®) gebruikt, hou dan rekening met de volgorde van de medicijninname: eerst de luchtwegverwijder en na 15 minuten de luchtbeschermer
- Bewaar de dosis-aerosol op kamertemperatuur.
- Om te controleren of er medicatie in het spuitbusje zit, kunt u hiermee - na goed schudden - tegen een spiegel spuiten. Verschijnt er een zichtbaar wit randje op de spiegel, dan zit er nog voldoende geneesmiddel in. Let ook steeds op de vervaldatum!

### ASZ

#### CAMPUS AALST PEDIATRIE

Merestraat 80  
9300 Aalst  
T +32 (0)53 76 47 00

#### CAMPUS GERAARDSBERGEN PEDIATRIE

Gasthuisstraat 4  
9500 Geraardsbergen  
T +32 (0)54 43 21 11 (raadplegingen via onthaal)

#### CAMPUS WETTEREN PEDIATRIE

Wegvoeringstraat 73  
9230 Wetteren  
T +32 (0)9 368 82 26

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

© september 2017 ASZ



Informatiebrochure

**Aerochamber®**