

| Aflibercept (Zaltrap®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie te geven in combinatie met aflibercept. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Aflibercept is een doelgericht geneesmiddel dat bindt aan tumorcellen en de bloedtoevoer naar deze cellen vermindert. Tumorcellen maken bloedvaten aan. Via deze weg verkrijgt de tumor voedingsstoffen en zuurstof om te groeien. Aflibercept remt de vorming van deze bloedvaten, waardoor de tumor minder zuurstof en voedingsstoffen verkrijgt. Hierdoor wordt de groei van de tumor onderdrukt.

Verloop therapie

Aflibercept wordt 1 x om de 14 dagen toegediend. De inlooptijd is 60 minuten. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Hoge bloeddruk/pols
- Proteïnurie (te veel eiwit in de urine)
- Problemen met wondgenezing (belangrijk te vermelden bij een chirurgische ingreep)
- Slijmvliesbloedingen
- Buikpijn

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

Wanneer een verhoogde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.

Indien u plots te kampen krijgt met neusbloedingen dient u deze te stelpen. Dit doet u door uw hoofd voorover te buigen, net onder het neusbeen te drukken en dit gedurende minimaal 10 minuten. Wanneer de bloeding aanhoudt dient u een arts te contacteren.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- er zich uitvalsverschijnselen voordoen.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

I Bevacizumab (Avastin®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie te geven in combinatie met bevacizumab. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam. Dit antilichaam bindt zich selectief aan een eiwit dat de groei van de tumor stimuleert. Dit eiwit zorgt ervoor dat er bloedvaten door de tumor worden aangetrokken en binnen de tumor groeien. Deze bloedvaten leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Wanneer het monoklonaal antilichaam aan het eiwit bindt, heeft dit als effect dat de bloedvaatjes naar en binnenin de tumor afsterven, met als gevolg dat er minder voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd kan worden. Bevacizumab in combinatie met chemotherapie zorgt voor een betere werking.

Verloop therapie

De toediening gebeurt 1 x om de 3 weken. De inlooptijd is een half uur. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Hoge bloeddruk
- Proteïneurie (te veel eiwit in de urine)
- Problemen met wondgenezing
- Arteriële thrombo-embolie (bloedklonters)
- Heesheid
- Slijmvliesbloedingen
- Darmperforaties (het spontaan ontstaan van een gaatje in het maagdarmsstelsel)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

Wanneer een verhoogde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.

Indien u plots te kampen krijgt met neusbloedingen dient u deze te stelpen. Dit doet u door uw hoofd voorover te buigen, net onder het neusbeen te drukken en dit gedurende minimaal 10 minuten. Wanneer de bloeding aanhoudt dient u een arts te contacteren.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- er zich uitvalsverschijnselen voordoen.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

| Carbo-Gemcitabine

In samenspraak met uw arts is er beslist om de chemotherapie carbo-gemcitabine op te starten. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Deze therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen: Carboplatine en Gemcitabine.

Verloop therapie

Voor de start van de chemotherapie zal er telkens een bloedafname gebeuren en wordt er via het infuus medicatie toegediend ter preventie van acute bijwerkingen.

Schematische voorstelling van de therapie:

Generieke naam	Merksnaam	Dag				Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-14	
Gemcitabine	Gemzar®	dagkliniek	rust	dagkliniek	rust	Infuus over 60 min
Carboplatine	Paraplatin®	dagkliniek	rust	dagkliniek	rust	Infuus over 60 min

De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
- Vermoeidheid
- Slijmvliesontstekingen in mond (aften) en darmen (diarree)
- Verandering van smaak
- Verminderde eetlust
- Perifere neuropathie

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

Zolang de behandeling loopt - ook thuis - vermijdt u best blootstelling aan koude, dit voor de perifere neuropathie. Hiermee wordt bedoeld dat u extra voorzichtig moet zijn wanneer u bijvoorbeeld iets uit de koelkast of diepvriezer neemt.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u aanhoudende krampende pijn en/of druk heeft in de borstkas.
- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- u langer dan 2 dagen diarree heeft ondanks inname Imodium®.
- u diarree heeft en ook moet braken.

- u last heeft van een branderig gevoel aan de aars.
- u bloed in het braaksel, urine of de stoelgang ziet.
- uw stoelgang zwart kleurt.
- u zich duizelig voelt, kortademig bent, pijn heeft op de borstkas.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

Cetuximab (Erbix®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om cetuximab op te starten. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Cetuximab is een monoclonale therapie die zich vasthecht aan een bepaald eiwit die zich op abnormale cellen bevindt. Hierdoor wordt de groei van deze cellen afgeremd.

Verloop therapie

Cetuximab wordt via een infuus gegeven over 60 minuten. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf op het dagziekenhuis.



Mogelijke nevenwerkingen

- Lage bloeddruk
- Huiduitslag/nagelverandering
 - Vanaf enkele dagen na de aanvang van de behandeling:*
Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, hoofdhaar, hals, borst en rug. Deze kunnen soms jeuken of pijnlijk aanvoelen
 - Na een vijftal weken*
Droge huid op armen, benen en door de acne aangetaste delen. Soms ontstaan t.g.v. de droge huid eczema en kloven
 - Bij langdurige behandeling (na 10 weken)*
Kloven in vingers en hielen, droge slijmvliezen (vaginaal, rode ogen)
 - Na 4-8 weken behandeling*
Nagelbedontsteking (tenen en/of vingers). Kan lijken op een ingroeide nagel.
 - Andere huidreacties*
bruine verkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, verandering van beharing (lange wimpers, mild haarverlies, tragere groei baard,...)
- De ernst van de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Sommige ontwikkelen een ernstige vorm van acne, bij de meerderheid zijn de symptomen milder.
- Ademhalingsmoeilijkheden (vooral tijdens de infusie)
- Allergische reactie
- Spierkrampen (magnesiumtekort)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

- Wanneer een verlaagde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.
- Huidvriendelijke adviezen:
 - * Zeep droogt uit, gebruik daarom zeepvervangers.
 - * Vermijd heet water en zonlicht (droogt huid uit).
 - * Gebruik hydraterende producten op uw armen/benen. Opgelet: gebruik deze niet op de plaatsen met acne!

- * Om de acne te bedekken mag u fond de teint aanbrengen. Deze verwijdert u best met een zachte lotion.
- * Gebruik geen vrij te verkrijgen anti-acneproducten.
- * Vraag steeds advies aan de verpleging op de dagkliniek, de onco-coach of de behandelende arts voor bijkomende ondersteuning wat betreft uw huid.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.
- er zich uitvalsverschijnselen voordoen.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

| Folfiri

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie met Folfiri te starten. Hiervoor dient u **niet** te overnachten of nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Folfiri bestaat uit een combinatie van Irinotecan, Levofolic® en 5-Fluorouracil (5-FU). Levofolic is geen chemotherapie, maar zorgt ervoor dat de 5-FU beter opgenomen wordt in uw lichaam en zo de werking versterkt.

Verloop therapie

Deze therapie wordt via uw poortkatheter (PAC) toegediend. Nadat de verpleegkundige uw poortkatheter heeft aangeprikt en er een bloedanalyse is gebeurd, wordt uw cystotica klaargemaakt in de apotheek.

Voor de start van de chemotherapie wordt via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoiden ter preventie van acute bijwerkingen. Een lage dosis Atropine® wordt gegeven ter preventie van bijwerkingen die kunnen optreden bij de toediening van Irinotecan (zweeten, buikpijn, diarree, tranenvloed, overvloedige speekselproductie en gezichtsstoornissen).

De Irinotecan en Leucovorin worden tegelijkertijd toegediend over 2 uur, de 5-FU wordt nadien toegediend over 10 minuten.

Aan het einde van de toediening wordt een dosis 5-FU via een pompje met bijgeleverd heuptasje aangekoppeld. Dit pompje loopt gedurende 48 uur via de poortkatheter. Hierna dient het pompje door de thuisverpleging afgeschakeld te worden. Het pompje dient na afschakelen te worden verpakt in een dubbele plastic zak en in een open ruimte worden bewaard (buiten bereik van kinderen bewaren). Het heuptasje dient worden hergebruikt en meegebracht bij uw volgende behandeling. Na het afkoppelen van de infuuspomp volgen er 10 dagen rust vooraleer een nieuwe kuur gestart wordt.

Uw arts zal met u het aantal toedieningen bespreken. Na drie toedieningen gebeurt er een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en al dan niet een radiologisch onderzoek. De resultaten worden met u besproken op de consultatie.

Schematische voorstelling van de therapie:

Generieke naam	Merknaam	Dag			Wijze van toediening
		1	2	3	
Irinotecan	Campto	dagkliniek			Infuus over 1 uur
Leucovorine	Elvorine	dagkliniek			Infuus over 2 uur
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek			Infuus over 10 minuten
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek	pomp thuis	pomp thuis	Pomp over 48 uur

De toediening gebeurt 1x om de 14 dagen. De toedieningstijd is niet gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
= bloedarmoede, vatbaarder voor infecties
- Vermoeidheid

Wanneer u te kampen krijgt met diarree kan er zo nodig Imodium® worden opgestart. Soms is een uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten.

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies
- Haaruitval
- Krampende pijn in de borstkas
- Hand-voetsyndroom (droge, rode handen en voeten)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen. Hiervoor maakt u gebruik van uw dagboek symptoomlast, dat u aangeboden krijgt door de verpleegkundige bij de start van uw therapie.

Wat kan u zelf doen?

- Huid hydrateren
- Imodium® tegen diarree nemen indien nodig. Ook de voeding kan aangepast worden, hiervoor staat een diëtiste ter beschikking op de dienst.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u aanhoudende krampende pijn en/of druk heeft in de borstkas.
- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- u langer dan 2 dagen diarree heeft ondanks inname Imodium®.
- u diarree heeft en ook moet braken.
- u last heeft van een branderig gevoel aan de aars.
- u bloed in het braaksel, urine of de stoelgang ziet.
- uw stoelgang zwart kleurt.
- u zich duizelig voelt, kortademig bent, pijn heeft op de borstkas.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

| Folfox

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie met Folfox te starten. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Folfox bestaat uit een combinatie van Oxaliplatinum, Levofolic® en 5-Fluorouracil (5-FU, dit zijn celremmende geneesmiddelen (cytostatica)). Levofolic is geen chemotherapie, maar zorgt ervoor dat de 5-FU beter opgenomen wordt in uw lichaam en zo de werking versterkt.

Verloop therapie

Deze therapie wordt via de poortkatheter (PAC) toegediend. Nadat de verpleegkundige uw poortkatheter (PAC) heeft aangeprikt en er een bloedanalyse is gebeurd, wordt uw cytostatica klaargemaakt in de apotheek.

Voor de start van de chemotherapie wordt via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoïden ter preventie van acute bijwerkingen. De Oxaliplatin en Leucovorin wordt tegelijkertijd toegediend over 2 uur, de 5FU wordt nadien toegediend over 10 minuten.

Aan het einde van de toediening wordt een dosis 5-FU via een pompje met bijgeleverd heuptasje aangekoppeld. Dit pompje loopt gedurende 48 uur via de poortkatheter. Hierna dient het pompje door de thuisverpleging afgeschakeld te worden. Het pompje dient na afschakelen te worden verpakt in een dubbele plastic zak en in een open ruimte worden bewaard (buiten bereik van kinderen bewaren). Het heuptasje dient worden hergebruikt en meegebracht bij uw volgende behandeling. Na het afkoppelen van de infuuspomp volgen er 10 dagen rust vooraleer een nieuwe kuur gestart wordt.

Uw arts zal het aantal toedieningen met u bespreken. Na vier toedieningen gebeurt er een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en al dan niet een radiologisch onderzoek. De resultaten worden met u besproken op de consultatie.

Schematische voorstelling van de therapie:

Generieke naam	Merknaam	Dag			Wijze van toediening
		1	2	3	
Oxaliplatine	Eloxatin	dagkliniek			Infuus over 2 uur
Leucovorine	Elvorine	dagkliniek			Infuus over 2 uur
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek			Infuus over 10 minuten
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek	pomp thuis	pomp thuis	Pomp over 48 uur

De toediening gebeurt 1 x om de 14 dagen. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak = bloedarmoede, vatbaarder voor infecties
- Vermoeidheid
- Tintelingen in handen en voeten (neurotoxiciteit), voornamelijk bij contact met koude
- Hand-voetsyndroom (droge, rode handen en voeten)

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies
- Haar- en huidverandering
- Krampende pijn in de borstkas
- Diarree
- Tranende ogen
- Toesnoerend gevoel in de keel

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen. Hiervoor maakt u gebruik van uw dagboek symptoomlast, dat u aangeboden krijgt door de verpleegkundige bij de start van uw therapie.

Wat kan u zelf doen?

- Om de tintelingen aan handen en voeten te vermijden vermijdt u best blootstelling aan koude. Wees bijvoorbeeld extra voorzichtig wanneer u iets uit de koelkast of diepvriezer neemt.
- Huid hydrateren

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u aanhoudende krampende pijn en/of druk heeft in de borstkas.
- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- u langer dan 2 dagen diarree heeft ondanks inname Imodium®.
- u diarree heeft en ook moet braken
- u last heeft van een branderig gevoel aan de aars.
- u bloed in het braaksel, urine of de stoelgang ziet.
- uw stoelgang zwart kleurt.
- u zich duizelig voelt, kortademig bent, pijn heeft op de borstkas.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!

| Panitumumab (Vectibix®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om u de infusievloeistof Panitumumab te geven. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Panitumumab is een monoklonale therapie die zich vasthecht aan een bepaald eiwit dat zich op de abnormale cellen bevindt. Hierdoor wordt de groei van deze cellen afgeremd.

Verloop therapie

Panitumumab wordt 1 keer om de 14 dagen toegediend. De inlooptijd is 60 minuten. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Lage bloeddruk
- Huiduitslag/nagelverandering
 - Vanaf enkele dagen na de aanvang van de behandeling:*
Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, hoofdhaar, hals, borst en rug. Deze kunnen soms jeuken of pijnlijk aanvoelen
 - Na een vijftal weken*
Droge huid op armen, benen en door de acne aangetaste delen. Soms ontstaan t.g.v. de droge huid eczema en kloven
 - Bij langdurige behandeling (na 10 weken)*
Kloven in vingers en hielen, droge slijmvliezen (vaginaal, rode ogen)
 - Na 4-8 weken behandeling*
Nagelbedontsteking (tenen en/of vingers). Kan lijken op een ingroeide nagel.
 - Andere huidreacties*
bruine verkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, verandering van beharing (lange wimpers, mild haarverlies, tragere groei baard,...)
De ernst van de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Sommige ontwikkelen een ernstige vorm van acne, bij de meerderheid zijn de symptomen milder.
- Ademhalingsmoeilijkheden (vooral tijdens de infusie)
- Allergische reactie
- Spierkrampen (magnesium tekort)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

- Wanneer een verlaagde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.
- Huidvriendelijke adviezen:
 - * Zeep droogt uit, gebruik daarom zeepvervangers.
 - * Vermijd heet water en zonlicht (droogt huid uit).
 - * Gebruik hydraterende producten op uw armen/benen. Opgelet: gebruik deze niet op de plaatsen met acne!
 - * Om de acne te bedekken mag u fond de teint aanbrengen. Deze verwijdert u best met een zachte lotion.
 - * Gebruik geen vrij te verkrijgen anti-acneproducten.

- * Vraag steeds advies aan de verpleging in het dagziekenhuis, aan de onco-coach of de behandelende arts voor bijkomende ondersteuning wat betreft uw huid.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- de nevenwerkingen erger worden en uw normaal functioneren hierdoor in het gedrang komt.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!