

## | Inleiding

Je cardioloog heeft bij jou een aanhoudende episode van voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter vastgesteld. Deze twee hartritmestoornissen van de voorkamer kunnen middels een elektrische shock doorheen het hart beëindigd worden (elektrische cardioversie). Deze behandeling heeft als doel om het hart opnieuw in een normaal ritme te laten samentrekken.

CAMPUS AALST	CAMPUS WETTEREN	CAMPUS GERAARDSBERGEN
Dr. M. Rosseel	Dr. D. Viane	Dr. J. Van Besien
Dr. M. Debels	Dr. J. Simoens	Dr. S. Vandamme
Dr. J. Debrauwere		Dr. V. Jacobs
Dr. I. Buysschaert		
Dr. J. Simoens		
Dr. G. De Meyer		
Dr. V. Jacobs		
Dr. P. Vanduynhoven		
<i>Consulente:</i>		
Dr. F. Van Honsbrouck		

## | De voorbereiding

Voor een elektrische cardioversie wordt een dagopname voorzien.


Voorafgaand aan een cardioversie worden vaak een aantal bijkomende onderzoeken uitgevoerd: een bloedonderzoek (waarbij meestal de bloedstollingswaarden de belangrijkste zijn) en/of een slokdarmechografie (waarbij middels een sonde via de slokdarm uitgesloten wordt of een klonter al dan niet aanwezig is ter hoogte van het hart). Of deze onderzoeken al dan niet nodig zijn, wordt vooraf besproken met jou door je cardioloog. Deze onderzoeken worden ofwel tijdens de dagopname uitgevoerd ofwel ervoor (bijvoorbeeld op consultatie).

Je cardioloog zal vooraf met jou bespreken of bepaalde medicatie tijdelijk ingenomen of onderbroken dient te worden.


Voor het uitvoeren van een elektrische cardioversie dien je gedurende minstens 6 uur nuchter te blijven.

Bij opname wordt een elektrocardiogram (ECG) afgenomen. Soms blijkt op dat ogenblik dat het hartritme zich zelf hersteld heeft en dient de cardioversie niet uitgevoerd te worden. Indien de hartritmestoornis toch aanwezig is, wordt een infuus via de arm geplaatst. Via dit infuus kan onder andere slaapmedicatie worden toegediend.

## | De elektrische cardioversie



De behandeling gaat door op het operatiekwartier. De anesthesist dient je een slaapmiddel toe waardoor je van de behandeling niets merkt. Op het ogenblik dat je voldoende slaapt, zullen jou één of meer elektrische shocks toegediend worden door de cardioloog. Na toediening van de nodige shock(s) wordt de slaapmedicatie gestopt. Wanneer je weer bij het volle bewustzijn bent, word je terug naar je kamer gebracht.



## | De nazorg

Eens terug op je kamer zal een nieuw ECG afgenomen worden. Dan kan je ook meegedeeld worden of de behandeling het beoogde resultaat heeft gehad.

Gezien de algemene narcose dien je nog gedurende 1 uur verder nuchter te blijven.

De nodige uitleg omtrent de verderzetting van je medicatie (onder andere bloedverduuners) zal je gegeven worden.

Er wordt tevens een afspraak gemaakt bij je cardioloog.

Aangezien je onder algemene narcose bent geweest, zal je zelf niet mogen rijden met een wagen. Zorg er dus voor dat iemand je na de cardioversie naar huis kan brengen.

Indien je nog vragen hebt aarzel dan zeker niet om deze te stellen aan je behandelende arts.

### ASZ

#### CAMPUS AALST CARDIOLOGIE

Merestraat 80  
9300 Aalst  
T +32 (0)53 76 67 30  
F +32 (0)53 76 67 37

#### CAMPUS GERAARDSBERGEN CARDIOLOGIE

Gasthuisstraat 4  
9500 Geraardsbergen  
T +32 (0)54 43 21 72  
F +32 (0)54 43 21 68

#### CAMPUS WETTEREN CARDIOLOGIE

Wegvoeringstraat 73  
9230 Wetteren  
T +32 (0)9 368 84 93  
F +32 (0)9 368 84 97

© november 2015 ASZ



Informatiebrochure  
**Elektrische cardioversie**